

## WirkstoffEinstufung Kartoffelfungizide

	Blattbefall <sup>1</sup>	Neuzuwachs	Stängelbefall	präventive Wirkung	Kurativität	Anti-sporulation	Regenfestigkeit	Wirkstoffverteilung <sup>2</sup>
<b>Zorvec Endavia (0,4 l/ha)</b>	<b>4,9</b>	<b>++(+)</b>	<b>++(+)</b>	+++	++	++(+)	+++	<b>S + T</b>
Metalaxyl + Mancozeb (2,0 kg/ha)		++	++	++(+)	++(+)	++(+)	+++	S + C
Propamocarb + Fluopicolide (1,6 l/ha)	3,8	++	++	+++	++	++(+)	++(+)	S + C/T
Benthiavalicarb + Mancozeb (2,0 kg/ha)	3,7		+(+)	+++	+(+)	+	++(+)	T + C
Mandipropamid + Cymoxanil (0,6 l/ha)	4,4	++	+(+)	+++	++	+(+)	+++	C/T + T
Mandipropamid + Difenoconazol (0,6 l/ha)	4,0	++	+(+)	+++	+	+(+)	+++	C/T + C

<sup>1</sup> Gesamteinstufung Wirkung gegen Blattbefall, Skala 2–5

<sup>2</sup> S: systemisch; T: translaminar; C: Kontakt

 Aktuell höchste Einstufung

Einstufung	Beschreibung
+++	Sehr gute Wirkung
++	Gute Wirkung
+	Ausreichende Wirkung
leer	Keine Einstufung

Quelle: EuroBlight; Fungizideinstufung; März 2020 ([www.euroblight.net](http://www.euroblight.net))